

子どもの予防接種

中泊町では、予防接種法に基づく定期予防接種を、個別接種で実施しています。予防接種の種類によって、接種方法や接種時期、回数、予診票の色などが異なりますのでご注意ください。接種忘れのないように計画的に接種しましょう。

【予防接種の種類】

定期予防接種（町が実施する予防接種で無料）

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタワクチン、BCG（結核）、急性灰白髄炎（ポリオ）、ジフテリア、百日せき、破傷風、麻しん、風しん、水痘（水ぼうそう）、日本脳炎、子宮頸がん予防ワクチン

*ほかに任意予防接種(各自で接種する予防接種で有料)として、インフルエンザ、おたふくかぜ があります。主治医と相談の上、接種しましょう。



【予防接種を受ける際の注意】

☆予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。日ごろからお子さんの体質や体調など健康状態によく気を配りましょう。

☆受ける予定の予防接種について、事前に説明書『予防接種と子どもの健康』をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。

☆予診票は子どもを診て接種する医師への大切な情報です。また予防接種に対する同意書にもなります。責任をもって記入するようにしましょう。

☆予防接種を受ける際、保護者以外の方が同伴する場合は委任状が必要となります。各予診票の裏面を記載し持参してください。

【通知方法】：個別通知はしません。本冊子の説明を参考に計画的に接種して下さい。

【接種方法】

- ①接種可能な年齢に達したら、事前に医療機関に連絡し、予約をとりましょう。
- ②当日は予診票を記入し、保険証、母子健康手帳を必ず持参しましょう。

【転出される場合】


町外へ転出した場合（転出当日も含む）は、中泊町での接種対象外となります。接種方法については転出先の市町村にお問い合わせください。

■個別接種委託医療機関 ** 受診前に必ず予約をしておきましょう **

医療機関名	電話番号	※接種日時	予 約
井沼洋クリニック	(0173) 69-1071	毎週月・火・木・金曜日 (15:30～18:00) 毎週土曜日 (8:30～13:00)	3～5 日前まで 要予約、電話可
中里クリニック	(0173) 57-3636	毎週水・木曜日 (15:00～16:30)	1 週間前まで 要予約、電話可 ※ロタワクチンは実施 しません
中泊おの医院 (※1歳未満の子には 接種を行いません)	(0173) 57-5758	毎週月・火・水・金曜日 (8:30～12:00) (14:30～18:00) 毎週木・土曜日 (8:30～11:30)	1 週間前まで 要予約、電話可 ※ロタワクチンは実施 しません
国保小泊診療所	(0173) 64-2117	毎週水曜日 (13:00～16:00)	3～5 日前まで 要予約、電話可 ※ロタワクチンは実施 しません
かなぎ病院小児科	(0173) 53-3111	毎週月・木・金曜日 (9:00～11:00) (但し、月曜日はBCG不可)	3～5 日前まで 要予約、電話可

◇健康上の理由等緒事情により上記の委託医療機関で受けられない場合は、
県内他の医療機関でも受けられます。(県内広域化制度)
ただし、受診方法が異なりますので、事前に必ず役場町民課健康推進係
または小泊支所健康推進係までご連絡下さい。(連絡せずに受診した場合、
無料で受けられない場合がありますのでご注意下さい。)

《予防接種の接種間隔》 (R2年10月1日 定期予防接種実施要領改正による)



*ただし同種類のワクチン接種間隔についてはそれぞれ定められています。
ご確認のうえ接種して下さい。

■個別接種（委託医療機関で接種）

種 類	標準的な接種年齢	法律で定められた 接種対象者	回数	備 考
(不活化) ヒブ ワクチン	初回接種： 生後 2 月から 生後 7 月に至るまで	生後 2 月から 生後 60 月に至る まで	3 回	生後 2 月に達したら早 めに接種しましょう 生後 12 月に至るまで の間に 27 日以上、標 準的には 27 日から 56 日の間隔をおいて 3 回 接種して下さい。 初回接種は生後 12 月 に至るまでに行うもの とし、それを越えた場合 は行いません。
	追加接種： 初回接種終了後 7 月以 上、標準的には 7 月から 13 月までの間隔をおい て接種。	生後 2 月から 生後 60 月に至る まで	1 回	初回接種終了後、 7 月を経過したらすみ やかに接種しましょう。
	<p>《標準的な接種パターン以外》</p> <p>* 初回接種開始時に生後 7 月に至った日の翌日から生後 12 月に至るまでの間 にある者は、生後 12 月に至るまでの間に 27 日以上、標準的には 27 日から 56 日までの間隔をおいて初回 2 回接種。 追加接種については、初回接種に係る最後の接種日から 7 月以上、標準的 には 7 月から 13 月までの間隔をおいて 1 回接種。 ただし、初回 2 回目の接種は、生後 12 月に至るまでに行うものとし、これ を超えた場合は行わない。この場合の追加接種は、初回接種に係る最後の接 種後 27 日以上の間隔をおいて 1 回接種。</p> <p>* 初回接種開始時に生後 12 月から生後 60 月に至るまでの間にある者は、1 回 接種。</p>			
(不活化) 小児用 肺炎球菌	初回接種： 生後 2 月から 生後 7 月に至るまで	生後 2 月から 生後 60 月に至る まで	3 回	生後 2 月に達したら早 めに接種しましょう 生後 24 月(標準的 には生後 12 月)に至るま での間に、27 日以上 の間隔をおいて 3 回接種 して下さい。 ただし、初回 2 回目が 生後 12 月を超えた場 合は、初回 3 回目の接 種はしません。
	追加接種： 初回接種終了後 60 日 以上の間隔をおいた後 であって、生後 12 月 に至った以降、標準的には 生後 12 月から生後 15 月に至るまでの間に接種	生後 2 月から 生後 60 月に至る まで	1 回	初回接種終了後 60 日 以上の間隔をおいた後 であって、生後 12 月 に至った以降にすみやか に接種しましょう。
	<p>《標準的な接種パターン以外》</p> <p>* 初回接種開始時に生後 7 月に至った日の翌日から生後 12 月に至るまでの間 にある者は、生後 24 月(標準的には生後 12 月)に至るまでの間に 27 日 以上の間隔をおいて初回 2 回接種。追加接種については生後 12 月以降に、初 回接種終了後 60 日以上の間隔をおいて 1 回接種。 * 初回接種開始時に生後 12 月に至った日の翌日から生後 24 月に至るまでの 間にある者は、60 日以上の間隔をおいて 2 回接種。 * 初回接種開始時に生後 24 月に至った日の翌日から生後 60 月に至るまでの 間にある者は、1 回接種。</p>			

種 類	標準的な接種年齢	法律で定められた 接種対象者	回数	備 考
(不活化) B型肝炎	生後2月に達した時から 生後8月にするまでの期間	生後1歳に至るまで	3回	1回目接種から27日以上 の間隔で2回目接種。 更に1回目接種から 139日以上の間隔を おいて3回目接種して 下さい。
(経口生) ロタ ワクチン	1価 ロタリックス 初回接種を生後2か月 ～生後14週6日後ま でに行う	出生6週0日後 ～24週0日後 まで	2回	27日以上の間隔を おいて2回接種して 下さい。
	※R2.10.1開始 ※R2.8.1以降 に出生した方 5価 ロタテック 初回接種を生後2か月 ～生後14週6日後ま でに行う	出生6週0日後 ～32週0日後 まで	3回	27日以上の間隔を おいて3回接種して 下さい。
(不活化) 4種混合 ジフテリア 百日咳 傷風 ポリオ	1期初回： 生後3月に達した時 から生後12月に達す るまで	生後3月から 生後90月に至る まで	3回	20日以上、標準的には 20日から56日までの 間隔を おいて3回接種して 下さい。
	1期追加： 1期初回3回目終了後、 6月以上、標準的には 12月から18月まで の間隔を おいて接種	生後3月から 生後90月に至る まで	1回	1期初回3回目終了後、 6月以上の間隔を おいて 接種して 下さい。
(注射生) B C G	生後5月に達した時 から生後8月に達する までの期間	生後1歳に至る まで	1回	生後5月に達したら 早めに接種 しましょう。
(注射生) 麻しん 風しん (MR)混合	1期： 生後12月から 生後24月に至る まで	同左	1回	生後12月に達したら 早めに接種 しましょう。
	2期： 5歳以上7歳未満の 者であって、 小学校就学の 始期に達する 日の1年前の 日から当該 始期に達する 日の前日まで の間にある者	同左	1回	小学校就学前、 こども園 等の年長児が 対象となり ます。
(注射生) 水痘	生後12月から 生後36月に至る まで (標準的には生後12 月から生後15 月に至るま でに1回目を 接種し、1 回目終了後 6月から12 月の間隔を おいて2回 目を接種)	生後12月から 生後36月に 至るまで (1回目接種 後3月以上 の間隔をあ けて2回 目を接種す る)	2回	生後12月に達 したら早 めに接種 しましょう 1回目接種 後、標準 的には6 月から12 月の間 隔を おいて2 回接種 して 下さい。

種 類	標準的な接種年齢	法律で定められた 接種対象者	回数	備 考
(不活化) 日本脳炎	1 期初回： 3 歳に達した時から 4 歳に達するまで	生後 6 月～ 生後 90 月に至る まで	2 回	3 歳に達したら早めに接種しましょう 6 日以上、標準的に 6 日から 28 日までの間隔をおいて 2 回接種して下さい。
	1 期追加： 4 歳に達した時から 5 歳に達するまで (1 期初回 2 回目終了後、 6 月以上、標準的には おおむね 1 年を経過した 時期で、4 歳に達した 時から 5 歳に達する までの期間)	生後 6 月～ 生後 90 月に至る まで	1 回	1 期初回 2 回目終了後、6 月以上の間隔をおいて接種して下さい。
	2 期： 9 歳に達した時から 10 歳に達するまでの 期間	9 歳以上 13 歳未満	1 回	小学 3 年生になったら、役場町民課から予診票が送付されます。
(不活化) 2 種混合 ジフテリア 破 傷 風	11 歳に達した時から 12 歳に達するまでの 期間	11 歳以上 13 歳未満	1 回	小学 6 年生になったら、役場町民課から予診票が送付されます。
(不活化) 子宮頸がん 予防ワクチン	中学 1 年生	小 6～高 1 相当の 女子	3 回	現在、積極的な接種勧奨を控えております。 接種を希望される方は、問い合わせ下さい。

(注射生) 注射生ワクチン・(経口生) 経口生ワクチン・(不活化) 不活化ワクチン

■接種スケジュールの目安



年 齢	種 類		回数	備 考
2 か月	ロタワクチン (経口生)	1 価 ロタリックス	2 回	標準的には、初回接種を 生後 2 か月～出生 14 週 6 日後までに行い、27 日以上の間隔をおいて 接種
		5 価 ロタテック	3 回	
	ヒブワクチン (不活化)		3 回	生後 12 月までに 27 日 以上、標準的には 27 日 から 56 日までの間隔を おいて 3 回接種
	肺炎球菌ワクチン (不活化)		3 回	標準的には生後 12 月ま でに、27 日以上の間隔 をおいて 3 回接種
3 か月	B 型肝炎ワクチン (不活化)		3 回	標準的には生後 8 月ま でに 27 日以上の間隔で 2 回接種。更に 1 回目接 種から 139 日以上の間 隔をおいて 3 回目接種
	4 種混合 1 期初回 (不活化)		3 回	20 日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間 隔をおいて 3 回接種
5 か月 ～ 8 ヶ月	B C G (注射生)		1 回	生後 1 歳に至るまでに 接種
1 歳	麻しん・風しん混合 1 期 (注射生)		1 回	生後 12 月から生後 24 月に至るまでに接種
	水痘 (注射生)		2 回	生後 12 月から生後 36 月に至るまでに接種
	ヒブワクチン追加 (不活化)		1 回	初回接種終了後 7 月以 上、標準的には 7 月から 13 月までの間隔をおい て接種
	肺炎球菌追加 (不活化)		1 回	初回接種終了後 60 日以 上の間隔をおいた後で あって、生後 12 月に至 った以降、標準的には生 後 12 月から生後 15 月 に至るまでの間に接種
	4 種混合 1 期追加 (不活化)		1 回	1 期初回 3 回目終了後、 6 月以上、標準的には 12 月から 18 月までの間隔 をおいて接種
3 歳	日本脳炎 1 期初回 (不活化)		2 回	6 日以上、標準的には 6 日から 28 日までの間隔 をおいて 2 回接種

4 歳	日本脳炎 1 期追加 (不活化)	1 回	1 期初回 2 回目終了後 6 月以上、標準的にはおおむね 1 年を経過した時期で、4 歳に達した時から 5 歳に達するまでの期間に接種
(5 歳) 6 歳	麻しん・風しん混合 2 期 (注射生)	1 回	就学前年度に接種
9 歳	日本脳炎 2 期 (不活化)	1 回	小学 3 年生に通知あり
11 歳	ジフテリア・破傷風 2 種混合 (不活化)	1 回	小学 6 年生に通知あり
13 歳	子宮頸がん予防ワクチン (不活化)	3 回	希望者は、お問い合わせください。

法律で定められた接種年齢を過ぎると無料で受けられなくなります。

法律で定められた接種間隔に留意し接種を受けるようにして下さい。

麻しんと風しん両方に罹患(かかった)したことのある方は、麻しん、風しんワクチン接種が対象外となります。役場町民課健康推進係または小泊支所健康推進係にご連絡下さい。

麻しん、風しんどちらか一方罹患済みの場合でも、麻しん・風しん混合ワクチンの接種となります。

【ロタウイルスワクチンの予防接種について】

令和 2 年 1 0 月 1 日より、定期予防接種に追加されました。

令和 2 年 8 月 1 日以降に出生された方から対象になります。

- 重症胃腸炎を予防することができます。
- ワクチンには 2 種類 (1 価ロタリックス、5 価ロタテック) あります。同一のワクチンを接種します。どちらも同様の効果があります。
- 標準的には、初回接種を生後 2 か月～出生 1 4 週 6 日後までに行います。生後 1 5 週以降の初回接種はおすすめしていません。
- 接種後 1 ～ 2 週間は、「腸重積症」に注意して下さい。
(腸の一部が隣接する腸管にはまり込み閉塞状態になる)

腸重積症の症状

「突然是げしく泣く」「機嫌が良かったり、不機嫌になったりを繰り返す」
「嘔吐する」「血便が出る」「ぐったりして顔色が悪い」
これらの症状が、一つでも見られた場合は速やかに医療機関を受診しましょう。



予防接種に関する相談・問い合わせは・・・

○中泊町町民課健康推進係 ☎0173-57-2111 (内線 1411~1415)

○小泊支所健康推進係 ☎0173-64-2111